

核准日期：2007年01月30日
修改日期：2010年03月23日
修改日期：2010年12月06日
修改日期：2014年04月16日
修改日期：2015年12月01日
修改日期：2020年10月29日
修改日期：2021年07月09日
修改日期：2023年04月13日

盐酸昂丹司琼片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：盐酸昂丹司琼片

商品名称：昂丹司琼片

生产企业：齐鲁制药有限公司


【成份】


本品主要成份为盐酸昂丹司琼。

辅料：淀粉、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、微晶纤维素、聚维酮K30、羟丙基纤维素、交联聚维酮、聚乙二醇4000、聚山梨酯80、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、微晶纤维素、聚维酮K30、羟丙基纤维素、交联聚维酮、聚乙二醇4000、聚山梨酯80。

本品为白色或类白色片剂。

本品每盒含4mg（以C₁₅H₁₃N₃O计）片剂20片。

化学结构式：
化学结构式：



片。

1. 预防和治疗手术后的恶心呕吐；2. 预防和治疗手术后的恶心呕吐。

1)

止吐药引起的呕吐：化疗前15分钟、化疗后4小时、8小时各静脉注射昂丹司琼注射液8mg，停止化疗以昂丹司琼片8mg（2片），连用5天。

2) 化疗药引起的呕吐：化疗前15分钟静脉注射昂丹司琼注射液8mg，以后每8~12小时口服昂丹司琼片

8mg（2片），连用5天。

3) 放疗引起的呕吐：首剂须于放疗前1~2小时口服片剂8mg（2片），以后每8小时口服8mg（2片），疗程视放疗

剂量而定。放疗前1小时口服片剂8mg（2片），以后每8小时口服片剂8mg（2片），疗程视放疗剂量而定。

4) 与盐酸阿扑吗啡联合用药时有严重低血压和意识丧失的报道，故本品禁止与阿扑吗啡联合使用。

分子式：C₁₅H₁₃N₃O₂·HCl

分子量：355.86

【性状】

本品为白色或类白色片剂。

【适应症】

止吐药。用于：1. 预防

【规格】

4mg（以C₁₅H₁₃N₃O计）

【用法用量】

1. 对于高度催吐的化疗后每8~12小时口服昂丹司琼片8mg（2片），连用5天。
2. 对催吐程度不太强的化疗后每8~12小时口服昂丹司琼片8mg（2片），连用5天。
3. 对于放疗引起的呕吐，疗程视放疗的剂量而定。

【不良反应】

可有头晕、头痛、乏力、嗜睡、便秘、口干、皮疹、偶见支气管哮喘或过敏反应、短暂性无指征转氨酶增高。上述反应轻微，无须特殊处理。个别患者可有过敏反应。并有胸痛、心律不齐、低血压及心动过缓的罕见报告。

【禁忌】

由于昂丹司琼片与阿扑吗啡联合使用

有严重低血压和意识丧失

的报道，故本品禁止与阿

扑吗啡联合使用。

【注意事项】

1. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

2. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

3. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

4. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

11. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

12. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

13. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

14. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

15. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

16. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

17. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

18. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

19. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

20. 对本药过敏者禁用，过敏体质者慎用。

